



VIH/SIDA ENTRE HISPANOS/LATINOS EN GEORGIA


División de Protección de la Salud
Sección de Epidemiología
Unidad de Vigilancia de VIH/SIDA

Datos demográficos sobre los Hispanos/Latinos en Georgia

- De acuerdo con el censo realizado en el año 2005, había 625.028 Hispanos/Latinos en el estado de Georgia*
- La población Hispana/Latina creció un 30 por ciento desde el año 2000 hasta el 2005 en Georgia. Entre los 625.028 Hispanos/Latinos, el 63 por ciento eran Mexicanos, el ocho por ciento Puerto Riqueños, el tres por ciento Cubanos, y el 26 por ciento otros Hispanos de diferentes orígenes *

Datos sobre VIH/SIDA

- El número de casos nuevos de SIDA reportados ha disminuido tanto en Georgia como a nivel nacional desde mediados de 1990. Lo mas probable es que este descenso se deba a la alta efectividad de las terapias retrovirales (HAART, por sus siglas en Inglés) que retardan el progreso y desarrollo del SIDA a partir de la infección con el VIH****
- El reporte confidencial de personas VIH positivas (No de SIDA) empezó en Diciembre 31 del 2003. Esto ha hecho que aumente el número de personas diagnosticadas con VIH/SIDA. Habían 60 casos de Hispanos/Latinos con VIH/SIDA en el año 2000. En el año 2007, el número de casos diagnosticados con VIH/SIDA había aumentado a 116 (ver gráfica)*



**Otros incluyen Asiáticos, Nativos de Hawai y de las Islas Pacíficas, Indios Americanos y Nativos de Alaska, Mestizos (Multirraciales) y de razas desconocidas.

- Había 1.065 Hispanos/Latinos viviendo con SIDA en Georgia, en Diciembre 2005 ***
- En el 2005, la tasa de adultos/adolescentes Hispanos/Latinos con SIDA en Georgia fue de (23.2 por 100.000) mas del doble de la tasa de los Blancos (8.7 por 100.000). Los latinos tienen la Segunda tasa más alta en Georgia***
- Durante los años 2000-2005, más del 77 por ciento de los casos de SIDA entre Hispanos/Latinos, en Georgia, han sido entre hombres***

Modos de transmisión y factores de comportamiento riesgosos

- El reporte más alto de Hispanos/Latinos diagnosticados con SIDA en 2005, fué el de los hombres que tienen sexo con hombres (MSM) (18 por ciento), seguido por contactos heterosexuales (10 por ciento), transfusión/hemofilia (11 por ciento), drogas ilegales inyectadas (IDU) y MSM (cuatro por ciento), sin embargo la mayoría fue clasificada como factores de riesgo no identificados (66 por ciento)***
- Entre los encuestados en Georgia en el 2001 por el Sistema de Vigilancia del Comportamiento de factores de Riesgo (BRFSS por sus siglas en inglés) (48 por ciento) eran Hispanos/Latinos. Estos estaban menos enterados acerca del tratamiento para mujeres embarazadas con VIH y sus bebés que las mujeres Blancas (46 por ciento), que las Afro-Americanas (38 por ciento) y que las personas de otros grupos raciales (49 por ciento)***

*Fuente: United States Census Bureau (2000), and Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System (Julio 2007).

***Fuente: United States Census Bureau, (2000), Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System, (Julio 2007) y Georgia Division of Public Health, Behavioral Risk Factor Surveillance System, (BRFSS) (2001).

****Fuente: www.hivinfosource.org; www.healthypeople.gov

Para mayor información sobre estadísticas de VIH/SIDA contacte al Proyecto TAKE, VIH/SIDA del Georgia Office of Health Improvement al (404) 657-6707 o visite www.hiv-aidstakeproject.org